

## University of Groningen

### Odontogene ontstekingen

Vriezen, Theodoor Christiaan

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1970

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Vriezen, T. C. (1970). *Odontogene ontstekingen*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN BEHORENDE BIJ PROEFSCHRIFT\* TH. C. VRIEZEN

1

De lokale en uitgebreide scleroserende osteomyelitides van de kaken tonen in tegenstelling tot de andere vormen van chronische botontstekingen geen acute exacerbaties.

2

Edentate patiënten met een halfzijdige mandibularesectie zijn in staat om hun meest comfortabele beethoogte te bepalen.

3

Er zou epidemiologisch onderzoek moeten worden verricht om een correlatie tussen orthodontische afwijkingen en parodontopathieën te bepalen.

4

Een radioluentie aan de apex van een gebitselement is zonder meer geen bewijs voor een non-vitale pulpa.

5

Het punteren van een odontogene ontsteking in het maxillo-faciale en mandibulaire gebied dient achterwege gelaten te worden.

6

Bij een onderzoek naar de relatie tussen de beethoogte en de gehoorscherppte moet niet alleen de gehoorscherppte maar ook de beethoogte op een objectieve wijze worden bepaald.

7

Bij een proefexcisie uit een intra-oraal gelegen maligne neoplasma dient men zowel bij het geven van de anesthesie als bij het nemen van de biopsie steeds bedacht te zijn op het voorkomen van entmetastasen.

8

Uitgebreide preprothetische chirurgie is een symptomatische behandeling welke wordt toegepast zonder dat er gedegen studie is verricht over de fysiologische veranderingen van het orale systeem, die door deze vorm van chirurgie kunnen worden veroorzaakt.

9

In de toekomst zal optimale behandeling van patiënten slechts dan gewaarborgd kunnen zijn, wanneer reeds thans bij ziekenhuisbouw door middel van fusie en nieuwstichting tot schaalvergroting wordt overgegaan.

\* Titel: 'Odontogene ontstekingen' (juni 1970, Groningen).